

# DryCop 50 DF

**Fungicida en forma de  
"GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA" (WG)**



Cobre, en forma de Oxiclورو ..... 50% p/p (500 g/kg)

## **CARACTERÍSTICAS**

Fungicida foliar en forma de Microgránulos Dispersables, de acción preventiva, amplio espectro y buena persistencia.

## **APLICACIONES AUTORIZADAS**

- CÍTRICOS:** Contra Aguado, Bacteriosis, Fomopsis y Hongos endófitos
- FRUTALES DE HOJA CADUCA:** Contra Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia y Moteado.
- OLIVO:** Contra Repilo y Tuberculosis.
- HORTÍCOLAS:** Contra Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu.
- PATATA, TOMATE y LÚPULO:** Contra Mildiu.
- REMOLACHA:** Contra Cercospora.
- GARBANZO:** Contra Rabia.
- VID:** Contra Bacteriosis y Mildiu.
- ARBUSTOS ORNAMENTALES:** Contra Hongos endófitos y Royas.

## **DOSIS y MODO DE EMPLEO**

Aplicar en pulverización normal al 0,3-0,4% en primavera  
**Frutales de hoja caduca** al 0,6-0,8% en invierno.  
**Cítricos** al 0,2% excepto cuando el tratamiento es contra el Aguado que se dosificará al 0,1%, efectuando el tratamiento en otoño y pulverizando hasta una altura de 1,5 metros.

## **PRECAUCIONES**

No se recomienda su aplicación con tiempo frío y húmedo en cultivos sensibles al Cobre, como Cerezo y Ciruelo, Cucurbitáceas, Manzanos –var. Golden, Starking, Reineta, Jonathan, etc.–, Melocotonero, Patata, Perales de "Agua" (Blanquilla), Decana, Pasa crassana, Williams, etc. En Vid no aplicar durante la floración.

## **INCOMPATIBILIDADES**

Compatible con todos los fungicidas excepto DNOC, Polisulfuros Alcalinos y Tiram.

## **DATOS DEL REGISTRO**

- **Nº de Registro:** 22.209/10
- **Mitigación de Riesgos Medioambientales:**
  - Mamíferos : A
  - Aves : A
  - Peces : B. Mediana peligrosidad
  - Abejas : Compatible



Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

- **Plazo de seguridad:**
  - Hortícolas: 3 días
  - Hortícolas de hoja y resto de Cultivos: 15 días

E300106